

પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિના વિવિધ રોગ અને સારવાર

પ્રો

સ્ટેટ અખરોટના કદની ગ્રંથિ છે જે પુરુષોમાં પેટુના ભાગમાં મૂત્રાશયની નીચે આવેલી હોય છે. પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિની ઘરીને પેશાબની નણી (પુરેશા) પસાર થાય છે. પ્રોસ્ટેટનું કાર્ય વીર્યને પોષકતાત્વ આપવાનું હોય છે. પ્રોસ્ટેટનું 40 વર્ષ પછી થતાં ડોમોનલ ફેરફારના કારણે વધે છે. પ્રોસ્ટેટમાં સામાન્ય રીતે ત્રશ્શ પ્રકારના રોગ જોવા મળે છે.

**પ્રોસ્ટેટિક ઇન્ફેક્શન
(પ્રોસ્ટેટાઇટિસ)**

સામાન્ય રીતે નાની ઉમરના પુરુષોમાં જોવા મળે છે. આ રોગનું મુખ્ય કારણ જીતી સંબંધાને કારણે થતું ઈન્ફેક્શન છે. તેનાં લક્ષણોમાં પેશાબમાં બળતરા થબી, તાવ આવવો, પેટુના દુખાવો થબો તથા પેશાબ વારંવાર જરૂર પડે વગેરે હોય છે. પુરોલોજિસ્ટ દ્વારા શારીરિક તપાસ, યુરિનની તપાસ અને સોનોગ્રાફી દ્વારા નિદાન કરવામાં આવે છે. આ રોગની સારવાર લાંબા સમય સુધી એન્ટિ બાયોટિક તથા સોજી ઉતારવાની દવાઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે.

નિદાન પ્રોસ્ટેટિક હાઇપર પ્લેઝિયા (નીપીઓસ)


આ રોગ પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિની સાદી ગાંઠ તરીકે આળપાય છે. 40 વર્ષ પછી જ્યારે પ્રોસ્ટેટનું કદ વધે છે ત્યારે પેશાબની નણી પર દબાણ આવે છે અને પેશાબમાં તકલીફ શરૂ થાય છે. પેશાબમાં અટકાવ, બળતરા થબી, વારંવાર પેશાબ જરૂર જેવાં તેનાં લક્ષણો છે. આ રોગનું નિદાન પ્રોસ્ટેટિક ઈન્ફેક્શનના નિદાનની જીમ જ અને PSA નામના બ્લડ ટેસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવે છે.

શરૂઆતના તબક્કામાં જ્યારે આ રોગના કારણે થતી તકલીફ ઓછી હોય ત્યારે આ રોગ દવા (સિલોડોસિન, ટેમ્પુલોસિન વગેરે) દ્વારા સારવાર કરવામાં આવે છે. દર ત્રણમાંથી એક


પુરુષની કણ દવા દ્વારા કાપમ માટે સારવાર કરી શકાય છે. જ્યારે દદીને પેશાબ સાવ બંધ થઈ જાય (યુરિનરી રિટેન્શન) અને નણી ખોલવી પડે અથવા પેશાબમાં વારેધડીએ ઈન્ફેક્શન

Normal prostate

હેલ્પ ઇંગ વેલ્થ
ડૉ. હેમાંગ ભક્ષી



Prostatitis



પ્રોસ્ટેટનું
કેન્સર સામાન્ય રીતે
શરીરના બીજાં કેન્સરની
સરખામણીમાં ધીમું થતું
કેન્સર છે, પરંતુ તેને ગંભીર
પ્રકારનું અને જુવલેણ હોય છે

થાપ કે પેશાબ ભરાઈ રહેવાથી કિડની પર અસર થાપ કે મૂત્રાશયમાં પથરી થાપ તો સર્જરીનો વિકલ્પ જરૂરી બને છે. પ્રોસ્ટેટની સાદી ગાંઠની સર્જરી ઈન્ફ્રિયમાંથી નાનું દૂરભીન પસાર કરીને કરવામાં આવે છે. ગાંધાનું ટુકડા કરીને બહાર કાઢવાની આ સર્જરી લેગર થયવા ઈલેક્ટ્રોકોર્ટી દ્વારા કરી શકાય છે. જેમાં કોઈ પ્રકારનો ચીરો કરવાની જરૂર રહેતી નથી.

પ્રોસ્ટેટ કેન્સર

પ્રોસ્ટેટનું કેન્સર સામાન્ય રીતે 40 વર્ષની ઉંમર પછી જોવા મળે છે અને શરૂઆતના તબક્કામાં તેનાં ચિલો પ્રોસ્ટેટની સાદી ગાંઠ જેવાં જ હોય છે. આ રોગના નિદાનમાં શારીરિક તપાસ અને સોનોગ્રાફી ઉપરોક્ત PSA નો રિપોર્ટ (છથી વધુ) તથા બાયોપ્સી દ્વારા કરવામાં આવે છે.

રોગનું નિદાન કર્યા પછી કેન્સરનું સ્ટેજ નક્કી કરવા માટે અમયારાઈ તથા બોનસ્કેન અથવા PSMA પેટ સ્કેન કરવામાં આવે છે. જો આ કેન્સર પ્રોસ્ટેટ પૂર્તું મર્યાદિત હોય તો તેની સારવાર રેડિકટ પ્રોસ્ટેક્ટોમીના ઓપરેશન દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ ઓપરેશનમાં આખી પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ અને તેની આસપાસના ટિશ્યુડાયામાં આવે છે. આ ઓપરેશન રોબોટિક સર્જરી, ઓપન સર્જરી અથવા લેપ્ટોસ્કોપિક સર્જરી દ્વારા કરી શકાય છે. અત્યારે દુનિયાભરમાં આ ઓપરેશન રોબોટિક સર્જરી દ્વારા થાપ છે.

પ્રોસ્ટેટનું કેન્સર સામાન્ય રીતે શરીરના બીજાં થતું કેન્સર છે, પરંતુ તેને ગંભીર પ્રકારનું અને કેલાક કિસ્સામાં છલ્લાણ પણ કદી શકાય. આ કેન્સર થયવાના કોઈ ચોક્કસ કારણ નથી કે તેને થતું અટકાવી શકાય તેમ નથી ઓપરેશનના વિકલ્પ તરીકે રેડિયોથેરાપી પણ આપી શકાય આ રોગનું સમયસર નિદાન અને સારવાર થાપ તો આ કેન્સ

છલ્લાણ બનતા અટકે છે અને મર્ટી શકે છે. ■